

7. 孕育胎儿的器官是
- A. 输卵管 B. 子宫
C. 阴道 D. 卵巢
8. 脊柱侧面观生理性弯曲有
- A. 2 个 B. 3 个
C. 4 个 D. 5 个
9. 半月板属于
- A. 髓关节 B. 肘关节
C. 膝关节 D. 肩关节
10. 下列具有造血功能的是
- A. 骨质 B. 肋软骨
C. 骨膜 D. 红骨髓
11. 角膜位于
- A. 鼻 B. 耳
C. 眼 D. 喉
12. 肾上腺位于
- A. 肾的上方 B. 食管的后方
C. 气管的前方 D. 膀胱的下方
13. 胃液中，能杀灭胃内细菌的成分是
- A. 黏液 B. 水
C. 胃酸 D. 内因子
14. 生成尿液的器官是
- A. 肝 B. 胃
C. 肺 D. 肾
15. 蛙后肢皮肤受到伤害性刺激时，通过神经调节会出现
- A. 正反馈 B. 屈腿反射
C. 负反馈 D. 咳嗽反射
16. 成人每昼夜尿量持续超过 2500ml，属于
- A. 多尿 B. 少尿
C. 无尿 D. 正常

17. 人体在呼吸过程中,吸入和呼出的气体主要是
- A. CO_2 和 N_2 B. O_2 和 H_2
C. H_2 和 CO_2 D. O_2 和 CO_2
18. 人幼年时期生长激素分泌不足可导致的疾病是
- A. 肢端肥大症 B. 侏儒症
C. 巨人症 D. 抑脲症
19. 冬季是流感高发季,下列可用于治疗流感的药物是
- A. 抗肿瘤药 B. 抗病毒药
C. 抗心绞痛药 D. 抗癫痫药
20. 患者,70岁,血压170/100mmHg,临床诊断为高血压病,治疗选用
- A. 降压药 B. 降糖药
C. 调血脂药 D. 解热药
21. 二甲双胍能降低肠道对葡萄糖的吸收,临床常用于治疗
- A. 癫痫 B. 骨质疏松
C. 高血压病 D. 糖尿病
22. 患者因消化不良导致腹胀、胃部不适,药师可为患者推荐
- A. 抗菌药 B. 利尿药
C. 助消化药 D. 平喘药
23. 患者服用阿司匹林后出现恶心、呕吐,该不良反应是
- A. 肺纤维化 B. 骨髓抑制
C. 胃肠道反应 D. 心脏毒性
24. 抗结核药利福平为橘红色,服药后患者尿液、唾液、泪液多呈
- A. 蓝色 B. 橘红色
C. 绿色 D. 紫色
25. 下列疾病会导致发热的是
- A. 急性上呼吸道感染 B. 高血压病
C. 慢性胃炎 D. 癫痫
26. 春季来临,对花粉过敏的人可能会出现
- A. 糖尿病 B. 支气管哮喘
C. 胃溃疡 D. 尿路感染

27. 外伤致左上肢骨折, 使用石膏绷带处理的治疗方式为

- A. 复位
- B. 康复
- C. 抗感染
- D. 固定

28. 急性胆囊炎患者腹部的压痛点是

- A. 左肋前上棘与脐连线的中、外 1/3 交界处
- B. 右肋前上棘与脐连线的中、外 1/3 交界处
- C. 左侧腹直肌外缘与肋弓交界处
- D. 右侧腹直肌外缘与肋弓交界处

29. 慢性阻塞性肺疾病的标志性症状是

- A. 头晕
- B. 呕血
- C. 呼吸困难
- D. 发热

30. 急性心肌梗死患者胸骨后疼痛的性质是

- A. 压榨样
- B. 针刺样
- C. 刀割样
- D. 烧灼样

31. 急性阑尾炎患者的临床特征性表现是

- A. 恶心
- B. 呕吐
- C. 腹泻
- D. 转移性右下腹疼痛

32. 诊断糖尿病的空腹血糖标准是

- A. $\geq 7.0 \text{ mmol/L}$
- B. $\geq 11.1 \text{ mmol/L}$
- C. $\geq 17.8 \text{ mmol/L}$
- D. $\geq 16.1 \text{ mmol/L}$

二、判断题: 本大题共 24 个小题, 每小题 2 分, 共 48 分。判断下列各题正误, 正确的在答题卡上涂 "√", 错误的在答题卡上涂 "×"。

- 33. 肝属于脉管系统。
- 34. 男性生殖腺是睾丸。
- 35. 椎间盘位于相邻两个椎体之间。
- 36. 胸大肌位于腹前壁。
- 37. 右主支气管比左主支气管粗而陡直, 故气管异物更易坠入右主支气管。
- 38. 临床进行的硬膜外麻醉是将药物注入蛛网膜下隙内。
- 39. 男性尿道比女性尿道短。
- 40. 脑神经与脑相连。

41. 测量肺活量时,需做到在最大吸气后再尽力呼气。
42. 等量摄入高蛋白食物比单纯摄入糖类食物会更快出现饥饿。
43. 刺激交感神经使心率增快,属于抑制;刺激迷走神经使心率减慢,属于兴奋。
44. 给家兔输入大量生理盐水会导致尿量增多。
45. 抽取血液放入试管中,不会发生血液凝固。
46. 对乙酰氨基酚具有解热镇痛作用,是感冒发热常用药物。
47. 硝苯地平是常见降压药,高血压患者可不用参考药品说明书随意使用。
48. 甲硝唑有致畸作用,孕妇禁用。
49. 头孢类药物与乙醇同时服用可产生“双硫样”反应,用药期间应忌酒。
50. 巴比妥类药物有头晕、嗜睡等不良反应,患者服用后应避免驾驶车辆。
51. 细菌可导致感染性发热。
52. 疑似贫血患者应做血常规检查,明确红细胞数量及血红蛋白含量。
53. 糖尿病患者不需要定期监测血糖。
54. 生命体征包括体温、脉搏、呼吸和血压。
55. 腹膜刺激征表现为腹壁松软、压痛、反跳痛。
56. 单次测量血压就可以诊断高血压病。

三、综合题:本大题共3个小题,第一小题18分,第二小题13分,第三小题25分,共56分。

57. 请根据心血管系统解剖结构特点,结合临床应用,完成以下任务:

- (1) 写出心的位置。(2分)
- (2) 写出4个心脏的名称。(12分)
- (3) 写出你熟悉的2条上肢动脉血管名称。(4分)

58. 心脏的主要功能是泵血,心脏跳动推动血液在心血管系统内沿单一方向循环流动,请结合临床应用,回答下列问题:

- (1) 血液由哪2类成分组成?(4分)
- (2) 测量血压时,使用的主要仪器是什么?测量中,需使前臂与什么器官处于同一水平?所测得的最高值是收缩压,最低值是什么?(6分)
- (3) 心室收缩射血时,主动脉瓣处于开启还是关闭状态?(3分)

59. 案例分析:阅读下面给出的案例并完成下列任务。

患者,男性,19岁,因“发热、咳嗽、胸痛5天”就诊。患者于5天前洗冷水浴后出现寒战、高热,最高体温40℃。伴轻微咳嗽,咯铁锈色痰液。右侧胸部疼痛,为持续性隐痛。无呼吸困难、恶心、呕吐、腹泻、腹痛等症状,急诊入院。

查体: T 39.5℃ P 120次/分 R 26次/分 BP 120/80mmHg。神志清楚,查体合作,面部潮红。右侧上胸部语颤增强,叩诊为浊音,可闻及病理性支气管呼吸音和湿罗音。

心率 120 次/分，节律整齐，余无异常。

遵医嘱给予青霉素 G 治疗。

- (1) 该患者的初步诊断是什么？（3 分）
- (2) 相关诊断依据是什么（病史、症状和体征）？（6 分）
- (3) 该患者需要做哪些辅助检查？（4 分）
- (4) 青霉素 G 用药前是否需要皮试？（3 分）
- (5) 青霉素 G 为处方药，患者能否在零售药店自行随意购买？（3 分）
- (6) 青霉素 G 使用后出现的最严重不良反应是什么？发生该不良反应后首选什么药物进行抢救？（6 分）

机密★启用前

四川省2024年普通高等学校高职教育单独招生

医药类专业综合

注意事项:

- 1. 本试卷考试时间为 90 分钟，满分 200 分。
- 2. 考生必须在答题卡指定位置作答，答在试卷、草稿纸上无效。
- 3. 涂写部分必须使用 2B 铅笔，书写部分必须使用 0.5 毫米黑色墨迹签字笔。

一、单项选择题：本大题共 32 个小题，每小题 3 分，共 96 分。在每小题列出的备选项中只有一项是最符合题目要求的，请将其选出。

- 1. 指骨属于
 - A. 躯干骨
 - B. 上肢骨
 - C. 下肢骨
 - D. 颅骨
- 2. 胃位于
 - A. 左上腹
 - B. 右上腹
 - C. 左下腹
 - D. 右下腹
- 3. 喉软骨中呈完整环形的是
 - A. 甲状软骨
 - B. 杓状软骨
 - C. 会厌软骨
 - D. 环状软骨
- 4. 下列属于泌尿系统的器官是
 - A. 输精管
 - B. 小肠
 - C. 肺
 - D. 膀胱
- 5. 脊髓位于
 - A. 颅腔内
 - B. 腹腔内
 - C. 椎管内
 - D. 胸腔内
- 6. 在胸前壁正中触摸到的骨是
 - A. 胸骨
 - B. 股骨
 - C. 椎骨
 - D. 枕骨